

1. Le tabelle del DPR309/90 sono:
 - a. tre: I, II, III e l'allegato III-bis
 - b. quattro: I, II, III e la IV per le sostanze che hanno attività farmacologica usate in terapia
 - c. quattro: I, II, III, IV e l'allegato III-bis
 - d. cinque: I, II, III, IV e la tabella dei medicinali a sua volta suddivisa in cinque sezioni

2. Le ricette non ripetibile devono essere conservate in farmacia :
 - a. 2 anni
 - b. 6 mesi
 - c. 3 anni
 - d. 5 anni

3. La sigla TDL permette la dispensazione in SSN nella regione Lombardia di quali dei seguenti farmaci:
 - a. tutti i farmaci per la terapia del dolore
 - b. KOLIBRI, PATROL, COEFFERALGAN CPR E CPR EFF.
 - c. KOLIBRI, COEFFERALGAN CPR EFF., LONARID, PATROL, TACHIDOL BUSTINE
 - d. KOLIBRI, COEFFERALGAN CPR E CPR EFF., CONTRAMAL, PATROL, LONARID

4. I FANS COXIB agiscono:
 - a. stimolando in maniera selettiva la COX-2 senza interferire con la COX-1
 - b. inibendo in maniera selettiva la COX-2 senza interferire con la COX-1
 - c. inibendo in maniera non selettiva la COX-2 senza interferire con la COX-1
 - d. inibendo in maniera selettiva la COX-1 senza interferire con la COX-2

5. L'AIFA ha reso di recente disponibili nuove informazioni sull'aumento del rischio di tumore cutaneo non melanoma con esposizione a dosi cumulative crescenti di quale sostanza?:
 - a. valsartan
 - b. idroclorotiazide
 - c. amlodipina
 - d. acido clavulanico

6. I farmaci Omeopatici:
 - a. si possono esporre al pubblico come gli OTC e si distinguono tra di loro dalle diverse diluizioni
 - b. non richiedono autorizzazione all'immissione in commercio e si distinguono tra di loro dalle diverse diluizioni
 - c. non sono regolamentati e si distinguono tra di loro dalle diverse diluizioni
 - d. non si possono esporre al pubblico come gli OTC e si distinguono tra di loro dalle diverse diluizioni

7. La Farmacia dei servizi è stata ed è un nuovo approccio per integrare le farmacie in ambito sanitario e creare un network lavorativo tra farmacia-ospedale-paziente. Quali tra questi sono servizi erogabili in farmacia?:

- a. servizi di autoanalisi, giornate di screening, prenotazione esami
- b. servizi di infermieristica, fisioterapia, consulenza di professionisti sanitari medici
- c. cabina estetica, servizio di telemedicina, ricezione referti, consulenza di professionisti sanitari non medici
- d. tutte le risposte

8. Quali sono i cannabinoidi ritenuti farmacologicamente attivi:

- a. tetraidrocannabinolo
- b. cannabidiolo
- c. cannabinolo
- d. tutte le risposte

9. Gli integratori di ultima generazione utilizzati come supporto per i dolori articolari possono contenere:

- a. condroitina solfato, glucosamina solfato, omega 3
- b. condroitina solfato, glucosamina solfato, metilsulfonilmetano
- c. condroitina solfato, glucosamina solfato, trans-resveratrolo
- d. condroitina solfato, glucosamina solfato, acido biturrico

10. Quali di queste sostanze si utilizzano per la tosse con muco in eccesso da fluidificare?

- a. carbocisteina, ambroxolo, echinacea
- b. acetilcisteina, cloperastina, carbocisteina
- c. acetilcisteina, estratto di *Helix Pomatiae*, drosera
- d. carbocisteina, acetilcisteina, levodropropizina

11. Quali di questi medicinali si usano come antiipertensivi?

- a. amlodipina, olmesartan, simvastatina
- b. ramipril, sotalolo, rabeprazolo
- c. amlodipina, olmesartan, perindopril
- d. ramipril, flecainide, potassio cloruro

12. La schizofrenia resistente è trattata con:

- a. venlafaxina
- b. clozapina
- c. clorpromazina
- d. benzodiazepine

13. In farmacia possono essere dispensati tramite piani terapeutici attivati:

- a. presidi diabetici, alimenti per nefropatia
- b. presidi diabetici, presidi antiipertensivi
- c. presidi per aerosolterapia, alimenti per celiachia
- d. presidi per medicazioni, alimenti per celiachia

14. Il ceftriaxone è il principio attivo di quale farmaco:

- a. tazocin
- b. rocefin
- c. bactrim
- d. cefodox

15. I lattobacilli sono:

- a. batteri simbiotici presenti nel tratto gastrointestinale e vaginale
- b. batteri patogeni presenti nel tratto gastrointestinale e vaginale
- c. batteri molto presenti nel tratto intestinale e poco nella flora vaginale
- d. batteri miceti presenti nel tratto gastrointestinale e vaginale